CovapadFoam

INSTRUCCIONES DE USO

Nombre del producto
Apósito de espuma de silicona

Especificaciones
7,5×7,5 cm, 10×10 cm, 15×15 cm

Descripción del producto
El apósito de espuma de silicona consta de:
- una capa de silicona suave en contacto con la herida.
- una almohadilla absorbente flexible con tres capas: una de espuma de poliuretano, una capa de distribución de material no tejido y una capa con fibras de poliacrilato superabsorbente.
- una película exterior que es permeable al vapor e impermeable al agua.

Uso previsto
El apósito de espuma de silicona está diseñado para una amplia gama de heridas exudativas tales como úlceras de decúbito, úlceras en pies y piernas, así como heridas por traumatismos, p. ej., desgarros cutáneos y heridas quirúrgicas.

Instrucciones de uso
- Limpiar la herida según los procedimientos habituales.
- Secar bien la piel circundante.
- Retirar las láminas protectoras y aplicar el lado adhesivo sobre la herida. No estirar.
- Para unos resultados óptimos, el apósito de espuma de silicona deberá cubrir al menos 1-2 cm de la piel circundante seca para los tamaños más pequeños, y 5 cm para los tamaños más grandes, a fin de proteger la piel circundante frente a maceración y escoriación, así como de fijar el apósito de forma segura.
- Retirar el apósito utilizando pinzas, fórceps o bien con la mano enguantada, a fin de despegarlo de la herida con cuidado.

Contraindicación
- No usar el producto si la herida está infectada.
- Si aparecen síntomas alérgicos o enrojecimiento. Se ruega dejar de usarlo.
- Si la herida es provocada por deficiencia en el riego sanguíneo o por úlcera del pie diabético. Cuando se utilice el producto, comprobar el estado de la herida a diario.

Reacción adversa
Sin reacciones adversas

Precauciones
- En caso de signos de infección clínica, consultar a un profesional sanitario para tratar la infección de forma adecuada.
- No utilizar el apósito de espuma de silicona junto con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- El uso de apósitos en el marco de un tratamiento profiláctico no elimina la necesidad de continuar desarrollando y siguiendo un protocolo integral de prevención de úlceras de decúbito, p. ej., superficies de apoyo, cambios posturales, nutrición, hidratación, cuidado de la piel y movilidad.
- Si se reutiliza el producto, puede producirse tanto un deterioro en su rendimiento como contaminación cruzada.
- El apósito de espuma de silicona no se usará durante más de 7 días, y el tiempo de uso acumulado continuo no excederá los 30 días.
- El apósito de espuma de silicona deberá almacenarse en condiciones secas a una temperatura inferior a 35 °C (95 °F).
- Estéril. No utilizar si el envase interior está dañado o abierto antes de su uso. No reesterilizar.

Almacenamiento
Guardar en lugar fresco y seco por debajo de los 35 °C (95 °F)

Fecha de fabricación
Ver bolsa interior

Esterilización
Esterilización por irradiación

Vida útil
3 años

No reutilizar	Precaución
No utilizar si el envase está dañado	No reesterilizar
Esterilizado usando irradiación	Límite de temperatura
Fecha de caducidad	Consultar las instrucciones de uso
Código de lote	Fabricante
Fecha de fabricación	Representante autorizado en la ce

Distribución: 1A+A+A Wundprodukte GmbH · Aplerbecker Str. 69 · 40472 Düsseldorf · Alemania
www.1a-a-a-wundprodukte.de

CE 0197

Actualizado 03/2026 (V.01 ES)