1A+A+A WUNDPRODUKTE ... für Ihre Gesundheit

CovapadFoam

INSTRUÇÕES DE USO

Nome do produto
Curativo de espuma de silicone

Especificações
7,5×7,5 cm, 10×10 cm, 15×15 cm

Descrição do produto
O curativo de espuma de silicone é feito de:
- uma camada macia de silicone em contato com a ferida.
- uma base absorvente e flexível de três camadas: uma camada de espuma de poliuretano, uma de falso têxtil e uma camada de fibras de poliacrilato superabsorventes.
- uma película externa impermeável à água e permeável ao vapor.

Indicações
O curativo de espuma de silicone é indicado para inúmeras feridas com exsudato, como úlceras de pressão, úlceras nas pernas e pés e feridas traumáticas, como lacerações cutâneas e feridas cirúrgicas.

Instruções de uso
- Limpe a ferida de acordo com os procedimentos habituais.
- Seque cuidadosamente a pele circundante.
- Retire as películas protetoras e coloque o lado adesivo sobre a ferida. Não estique.
- Para resultados ideais, o curativo de espuma de silicone deve ultrapassar a pele circundante seca em, pelo menos, 1–2 cm nos tamanhos mais pequenos e em, pelo menos, 5 cm nos tamanhos maiores, para proteger da maceração e da escoriação e para fixar o curativo com segurança.
- Para remover o curativo, retire-o cuidadosamente da ferida com uma pinça, alicate ou mão protegida com luvas descartáveis.

Contraindicações
- Não utilize o produto em feridas infetadas.
- Se aparecerem vermelhidões ou sintomas alérgicos, o uso deve ser interrompido.
- No caso de feridas causadas por distúrbios circulatórios ou úlcera do pé diabético, a ferida deve ser monitorizada diariamente durante a utilização.

Reação adversa
Sem reações adversas conhecidas

Precauções
- Se houver sinais de infeção clínica, contate um profissional de saúde para obter o tratamento adequado.
- Não utilize o curativo de espuma de silicone com substâncias oxidantes, como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio.
- A utilização do curativo para um tratamento profilático não substitui a implementação de um protocolo abrangente de prevenção de decúbito de pressão, incluindo zonas de apoio adequadas, posicionamento, nutrição, hidratação, cuidados com a pele e mobilidade.
- A reutilização pode deteriorar o desempenho do produto e causar uma contaminação cruzada.
- O período de utilização do curativo de espuma de silicone não deve exceder 7 dias. A duração cumulativa contínua de utilização não deve exceder 30 dias.
- O curativo de espuma de silicone deve ser armazenado a seco e a temperaturas inferiores a 35 °C (95 °F).
- Estéril. Não utilize se a embalagem interna estiver danificada ou se ela foi aberta antes da utilização. Não esterilizar novamente.

Armazenamento
Seco a temperaturas inferiores a 35 °C (95 °F)

Data de fabricação
Consulte a embalagem interna

Esterilização
Esterilização por irradiação

Validade
3 anos

Não reutilizar	Cuidado
Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Não esterilizar novamente
Esterilização por radiação	Faixa de temperatura permitida
Válido até	Consultar as instruções de uso
Número do lote	Fabricante
Data de fabricação	Representante na Comunidade Europeia

Distribuição: 1A+A+A Wundprodukte GmbH · Aplerbecker Str. 69 · 40472 Düsseldorf · Alemanha
www.1a-a-a-wundprodukte.de

CE 0197

Publicação de 03/2026 (V.01 PT)